



L'incontinenza urinaria

Percezione, vissuto e modalità di coping

Novembre 2005

Tipologia di indagine:	indagine ad hoc 1 ^a fase - qualitativa motivazionale
Strumento di misurazione:	16 colloqui in profondità individuali; 4 colloqui in profondità di coppia;
Campione: Sofferenti del disturbo	- uomini e donne - età compresa tra i 35 e i 65 anni - sofferenti del disturbo di "incontinenza urinaria"
Operatori sanitari	- farmacisti, infermieri, medici di base, urologi, ginecologi
Rilevazioni:	20 - 31 Gennaio 2005, Milano e Roma

Tipologia d'indagine: indagine *ad hoc* su questionario semistrutturato

Modalità di rilevazione: interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.) e *on line* (sistema C.A.W.I.) su questionario semi-strutturato della durata di circa 10 minuti

Universo di riferimento: popolazione di età compresa tra 18 e 70 anni, residente in tutto il territorio nazionale

Campione: 3.000 interviste


Rilevazione: dal 10 giugno al 7 luglio 2005

LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA

La dimensione del problema


Il livello di conoscenza

Lei si ritiene molto, abbastanza, poco o per niente informato rispetto alle conseguenze del disturbo relativo alle perdite involontarie di urina e ai trattamenti disponibili per la soluzione del problema?




Base rispondenti: 3000

molto + abbastanza informato




La dimensione del problema

L'incidenza del disturbo sulla popolazione



La dimensione del problema

Le tipologie di incontinenza



L'incontinenza urinaria: percezione, vissuto e modalità di coping

IL VISSUTO